



وزارة الدولة لشؤون البيئة

جهاز شؤون البيئة


قطاع نوعية البيئة

الإدارة المركزية لنوعية المياه

ملخص نتائج الرحلة الحقلية الثالثة "فبراير ٢٠١٥"

لبرنامج الرصد البيئي للبحيرات المصرية

" بحيرة البردويل "



مقدمة

تمثل البحيرات المصرية أهمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز به من أعماق ضحلة وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية فانها تعتبر مربى وحضانات طبيعية لمختلف أنواع الأسماك الاقتصادية ليس فقط داخل هذه البحيرات ونظرا لما تتعرض له هذه البحيرات من عمليات صرف مستمرة لمختلف أنواع الملوثات الصناعية والصحية والزراعية مما يؤثر على كل من جودة ونوعية مياه هذه البحيرات وإنتاجها السمكى. لذلك فان البرنامج المقترح للرصد البيئى للبحيرات المصرية يهدف الى المتابعة الدورية لهذه البحيرات للوقوف على الظروف البيئية والملوثات المؤثرة عليها فى الأوقات و الأماكن المختلفة بغرض وضع برنامج قومى للحد من تأثير هذه الملوثات ووقف التدهور المستمر للبحيرات ووضع الخطط المستقبلية لحمايتها وحل مشاكلها وتنميتها المستدامة.

وصف البحيرة:

تقع بحيرة البردويل فى محافظة شمال سيناء وتشغل معظم الساحل السيناوى على البحر المتوسط وتمتد بطول ٨٥ كم تقريبا ويصل أقصى عرض لها ٢٢ كم وتبلغ مساحتها حوالى ٦٥٠ كم٢، وتعتبر بحيرة البردويل من أهم البحيرات المصرية لكونها أقل البحيرات الشمالية تلوثاً كما أنها تحتوى على أنواع عالية الجودة من الأسماك والتي يصدر معظم إنتاجها للخارج ، وهى من البحيرات الضحلة عالية الملوحة حيث يتراوح العمق بها بين (٠,٣ - ٣ متر) ويفصل البحيرة عن البحر المتوسط شريط ساحلى رملى يتراوح عرضه من ١٠٠ م الى ١ كم وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحتان صناعيتان يطلق عليها البواغيز حيث يحدث تبادل للمياه بين البحيرة والبحر المتوسط من خلال عملية المد والجزر.

تم أخذ عينات مائية ورسوبية قاعية من البحيرة بغرض إجراء التحاليل الهيدروكيميائية ، الأملاح المغذية ، القياسات البكتريولوجية ، مستويات الفلزات الثقيلة ، المبيدات الكورونية ومشتقاتها والهيدروكربونات البترولية الكلية بالإضافة إلى تقدير كتلة الهائمات النباتية والحيوانية ودراسة بعض الخواص الجيوكيميائية بها. تتم عملية الرصد من خلال ١٢ نقطة موزعة لتشمل مساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليها ، وفيما يلى بيان بنتائج تحليل عينات المياه والرواسب التي جمعت من البحيرة والمصارف.

المحطة	الموقع
١	التلول
٢	الروضة
٣	الزرايق
٤	بوغاز ٢
٥	أم التلول
٦	مسقط إبليس
٧	الجلس
٨	الرواق
٩	شمال الرواق
١٠	بوغاز ١
١١	النصر
١٢	الرابعة

نوعية المياه

• الخواص الهيدروكيميائية لمياه البحيرة

درجة الحرارة :-

تراوحت درجة حرارة مياه بحيرة البردويل ما بين (١١,٨٠ – ١٥,٢٠ درجة مئوية) بمتوسط عام في البحيرة (١٣,٨٨ درجة مئوية).

الشفافية :-

تراوح قيم شفافية مياه بحيرة البردويل ما بين ١٠٠ – ٢٠٠ سم بمتوسط عام للبحيرة ١٤٥,٨٣ سم.

الملوحة :-

أوضحت النتائج التوافق مع الدراسات السابقة حيث كانت ملوحة مياه البحيرة أعلى من مثيلاتها في البحر المتوسط وذلك نتيجةً لضحالة بحيرة البردويل وتعرض مياهها للتبخر المستمر. كما تتفاوت درجة ملوحة البحيرة تفاوتاً واضحاً بين المحطات المختلفة تبعاً لقربها أو بعدها من البواغيز. حيث تقل في المحطات المقابلة للبواغيز، حيث تراوحت الملوحة ما بين (٣٨,٠٩% – ٥٠,٠٦%) وكان المتوسط العام ٤٢,٣١%.

درجة التوصيل الكهربى :-

تراوحت قيم التوصيل الكهربى بين أقل قيمة (٥٧,٢٨ مللي سيمن/سم) بينما سجلت أعلى قيمة (٧٢,٧٦ مللي سيمن/سم) وكان المتوسط العام في البحيرة ٦٢,١٦ مللي سيمن/سم.

الأس الهيدروجيني :-

أوضحت الدراسة أن مياه البحيرة تقع في الجانب القلوي كما أن قيم أيون الهيدروجين كانت في المعدلات الطبيعية. وتراوحت قيم الأس الهيدروجيني لمياه البحيرة بين (٨,٤٥ – ٨,٦٨). بمتوسط عام في البحيرة ٨,٥٦.

الأكسجين الذائب :-

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن توزيع قيم الأكسجين الذائب في البحيرة كانت تتوزع توزيعاً غير منتظم حيث تراوح تركيز الأكسجين الذائب بين (٦,٩١ – ٨,٢١ ملليجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة (٧,٤٢ ملليجرام/لتر).

الأكسجين الحيوى الممتص (BOD) :-

تراوحت قيم الأكسجين الحيوى الممتص بين (٠,٧٠ – ١,٧١ ملليجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة ١,٢٧ ملليجرام/لتر.

الأكسجين الكيمائى المستهلك (COD) :-

تراوحت قيم الأكسجين الكيمائى المستهلك (١٠,١٢ – ٢٠,١٧ ملليجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة (١٣,٩١ ملليجرام/لتر).

الكبريتيدات :-

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود للكبريتيدات في مياه البحيرة نتيجةً لزيادة تركيز الأكسجين الذائب في مياه البحيرة طوال العام وكذلك عدم وجود مصادر تلوث في البحيرة.

الكورفيل-أ ، المواد العالقة الكلية :-

- ✓ تراوح قيم الكورفيل-أ بين ٠,٠٨١ - ٠,٥٦٩ ميكروجرام / لتر ومتوسط محتوى الكوروفيل فى البحيرة ٠,٣١١ ميكروجرام / لتر.
- ✓ بالنسبة للمواد العالقة فقد تراوحت بين ٥,٧٤٠ - ٢٧,٨٨٠ مليجرام / لتر بمتوسط عام للبحيرة ١٢,٨٨٤ مليجرام / لتر.

المغذيات :-

- هي عبارة عن مركبات نيتروجينية ذائبة فى المياه الطبيعية وتعتبر هذه المركبات المصدر الرئيسى لتغذية الكائنات فى البيئـة المائية (الأمونيا - النيتريتات - النترات - النيتروجين الكلى).
- تراوحت الأمونيا بين ٠,٠٠٤ - ٠,٣٧٠ مليجرام / لتر نيتروجين بمتوسط عام للبحيرة يصل الى ٠,١٠٣ مليجرام / لتر نيتروجين.
 - تراوحت قيم النيتريت بين ٠,٦٨٠ - ٣,٤٠٢ ميكروجرام / لتر نيتروجين بمتوسط عام للبحيرة ٢,١٤٥ ميكروجرام / لتر نيتروجين .
 - تراوحت قيم النترات بين ٠,٠٠٦ - ٠,٠٢٠ مليجرام / لتر نيتروجين بمتوسط عام للبحيرة ٠,٠١١ مليجرام / لتر نيتروجين.
 - وبالنسبة للنيتروجين الكلى فقد أشارت التحاليل الى أن التركيز فكان أقل من ١,٠ مليجرام / لتر نيتروجين بجميع محطات البحيرة حيث تراوح التركيز بين ٠,٥٥٧ - ١,٣٨٧ مليجرام / لتر نيتروجين بمتوسط عام للبحيرة ٠,٨٩٧ مليجرام / لتر نيتروجين.

الفوسفور (الفوسفات الفعال والكلى) :-

- تراوحت قيم الفوسفور الفعال يتراوح بين ٢,٠٧٤ - ٥,٥٣٠ ميكروجرام / لتر فوسفور بمتوسط عام للبحيرة ٣,٥٧٢ ميكروجرام / لتر فوسفور.
- وبالنسبة للفوسفور الكلى فقد تراوحت القيم بين ٨,٦١٠ - ٤٥,٤٠٠ ميكروجرام / لتر فوسفور بمتوسط عام للبحيرة ١٦,٩٦٠ ميكروجرام / لتر فوسفور.

السليكات الفعالة :-

- كانت قيم السليكات الفعالة تتراوح بين ٠,٠٣٢ - ٠,٣٠٨ مليجرام / لتر سليكا بمتوسط عام للبحيرة ٠,١٥٤ مليجرام / لتر سليكا.

مما سبق يتضح ان :-

بحيرة البردويل نظيفة وتركيز كل العناصر بها ضعيفة حيث أنها تقريبا أقل البحيرات كلها لكل العناصر ومتقاربه جداً وكلها فى حدود مياه البحر وذلك لعدم صب أي ملوثات بها سواء صناعية أو زراعية فالتغيرات بها طفيفة.

الفلزات الثقيلة:

- تراوح تركيز الحديد ما بين (٢٤,٢١٥ - ١١٦,٠٣٢ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٥٤,٦٣٣ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز المنجنيز ما بين (٢,٦٩١ - ٩,٠٣٨ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٤,٧٤٤ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز النحاس ما بين (٣,٠٨٩ - ١٦,٢٨٠ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٦,١٨٣ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز الزنك ما بين (٢٨,٩١٥ - ٩٧,٥٦٠ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٦١,٧٩٣ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز الكروم ما بين (٣,٨٢٦ - ٨,٤٧٧ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٦,٤٨٥ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز النيكل ما بين (٢,٩١٢ - ٨,٨٥٥ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٥,١٤٧ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز الكاديوم ما بين (٠,٢٥٥ - ١,٠٣٨ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٠,٥٣٥ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز الرصاص ما بين (١١,٠٠٩ - ٣٣,٥٠٠ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٢١,٧٠٨ ميكروجرام/لتر).
- تراوح تركيز الزئبق ما بين (٠,٠١٢٢-٠,٠٠٥٦ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة (٠,٠٠٩١ ميكروجرام/لتر).

المبيدات (TP) ومركبات البايفينيل متعددة الكلور (PCBs) :-

- تراوحت مجموع تركيزات مركبات البايفينيل متعددة الكلور (PCBs) ما بين (١,٥١٠ - ٥,٢٨٨ نانوجرام/لتر) بمتوسط عام (٣,٣٠١ نانوجرام/لتر).
- وتراوحت تركيزات مركبات المبيدات الكلية (TP) ما بين (٠,٧٢١ - ١,٥٦٣ نانوجرام/لتر) بمتوسط عام (١,٠٧١ نانوجرام/لتر).

الهيدروكربونات البترولية الكلية :-

- تراوح متوسطات التركيز الكلى للمواد الهيدروكربونية ذات الأصل البترولى ما بين (٠,٥٧ - ١,١٥ ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام (٠,٧٦ ميكروجرام/لتر).

الدلائل البكتيرية (القولون الكلية - البرازية - السبحية) :-

- تعتبر بحيرة البردويل من أنقى بحيرات مصر الشمالية فهى لا تستقبل مياه مصارف وتعتبر محمية طبيعية وبناء على ذلك وعند تطبيق معيار جودة المياه (Ministry of health, ٢٠٠٠) فتكون نتائج الرحلة الحقلية:
- ١ - من وجهة نظر الصحة العامة الأدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعاملهم مع المياه وعند تطبيق معيار جودة المياه المذكورة عليه وجد أن جميع محطات البحيرة تقع فى نطاق الحدود المسموح بها من أعداد البكتريا المشار إليها وتعتبر بحيرة نظيفة فى هذا الوقت من السنة (خلال فبراير ٢٠١٤) عدا المحطة رقم ١٢ (رابعة) والتي تعدت الحدود الحدود المسموح بها لمياه الشواطئ والاستحمام لبكتيريا (FS) Fecal streptococci حسب مقياس وزارة الصحة المصرى (Ministry of health, 1996).
 - ٢ - فى مرابى الأسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيرة كلها) فأن أعداد البكتيريا المشار إليها لم تتعدى الحدود المسموح بها فى جميع محطات البحيرة ، وبناء على ذلك تعتبر البحيرة كلها غير ملوثة وصالحة لتربية وصيد الأسماك فى هذا الوقت من السنة (خلال مايو ٢٠١٤).

الهائمات

الهائمات النباتية

توزيع وكثافة الهائمات النباتية ببخيرة البردويل:

- سجلت أربعة مجموعات من الهائمات النباتية فى البحيرة وهى الدياتومات وثنائية السوط والطحالب الخضراء والطحالب الخضراء المزرقة.
- رصد في بحيرة البردويل ٨٢ نوع (٤٤ جنس) منها ٥٨ نوع من الدياتومات (٢٩ جنس) و ٢١ نوع من ثنائية الهدب (١٢ جنس) و ٢ نوع من الطحالب الخضراء و نوع واحد من الطحالب الخضراء المزرقة .
- سجلت متوسط أعداد الهائمات النباتية بقيمة قدرها ١٨٣٧٧ وحدة / لتر .
- سجلت اعلى انتاجية فى المحطات ١٢ ، ٧ ، ١١ . بينما كانت أقل إنتاجية في محطة ٨ ومحطة ٣ .

الهائمات الحيوانية

تبين من تحليل العينات أن الأعماق التي تم عندها جمع العينات ضحلة جداً أيضاً ولا تتعدى المتر أو المتر والنصف وأن جميع المحطات مليئة بالحصى والشوائب وان محتواها ضعيف في الهائمات الحيوانية و معظم الأنواع تمثلت في اليرقات خاصة يرقات مجدافية الأرجل مكونة أكثر من ٣٤٪ من المجموع الكلي للهائمات وأكثر من ٦٤٪ من المجموع الكلي للقشريات وقد ظهرت علي جميع المحطات أي أن القشريات في مجموعها كونت ٥٤٪ من المجموع الكلي للهائمات ، تليها في الكثرة العددية شعبة الرخويات المثلة بيرقات صفائحية الخياشيم بنسبة ١٩,١٪ وأيضاً نوع واحد من جناحية الأقدام مكوناً ٢٠,٥٪ أي أن الرخويات في مجموعها كونت أكثر من ٣٩٪ معنى ذلك أن مجموعتي القشريات والرخويات كونتا حوالي ٩٣٪ من المجموع الكلي للهائمات .

وقد تمثلت الهائمات في هذا الموسم بسبعة شعب هي :-

- الأوليات Protozoa كونت في مجموعها ١,١٪ من المجموع الكلي للهائمات الحيوانية وقد تمثلت في نوعين من المثقبات Foraminifera وثلاثة أنواع من الجرسيات Tintinnids وقد سادت الجرسيات علي المثقبات وظهرت الأوليات علي المحطة الأولى والمحطات الوسطى .
- الجونمعويات Cnidarians ظهر منها نوع من الهيدرا علي المحطة التاسعة (شمال الرواق)
- العجليات الدوارة Rotifers تمثلت في هذا الموسم بثلاثة أنواع بنسبة ١,٧٪ ، منها نوع من هائمات المياه البحرية والباقي من سكان المياه العذبة أو المياه الشروب وقد ظهرت في معظمها علي المحطة السابعة (القلس).
- الحلقيات تمثلت في يرقات الديدان عديدة الأشواك مكونة ٣,٦٪ من المجموع الكلي للهائمات وقد ظهوروا جميعاً علي معظم المحطات وقد ظهرت أعلى القيم علي الحطتين الرابعة (بوغاز ٢) والعاشر (بوغاز ١).
- المفصليات Arthropods تمثلت في القشريات التي تمثل معظمها في مجافية الأرجل Copepods التي مكونة أكثر من ٥٣٪ من المجموع الكلي للهائمات وقد كونت باقي القشريات نسبة ٠,٥٪ والتي تمثلت في غمدية الدرقة Ostracoda ويرقات ذؤابية الأرجل Nauplii larvae of Cirripedia والتي ظهر غالبيتها علي المحطة الثانية عشرة (رابعة).
- الرخويات Mollusca تمثلت في يرقات الرخويات صفائحية الخياشيم Veligers of Lamellibranches (١٩,١٪) وقد سجلت علي معظم المحطات وكذلك الرخويات جناحية الأرجل Pteropod shells متمثلة في نوع Limacina inflata مكوناً أكثر من ٢٠٪ من المجموع الكلي للهائمات وقد ظهر هلي جميعاً علي المحطات ، أي أن الرخويات في مجموعها كونت أكثر من ٣٩٪ .

• الشوكليديات Echinodermata تمثلت في اليرقات التي ظهرت علي المحطة الخامسة (وسط التلول) بكميات قليلة جداً.

بلغ المجموع الكلي للهائمات ٢٢٠٥٠٠ كائن/م^٢ ، وقد سجلت المحطتان الحادية عشرة (النصر) والخامسة (وسط التلول) أعلى القيم العددية بينما احتوت المحطة الثانية (الروضة) أقل القيم العددية تليها المحطة الأولى (التلول).

الحيوانات القاعية

يتكون الهيكل العام الحيوانات القاعية أساسا من اصداف فارغة كلسية من الرخويات ذوات الصدفتين والبطنقدميات والاطومات حيث شملت هذه البنية على عدد ٢٨ نوعاً من الكائنات القاعية الحية وعلى ٤ انواع متمثلة باصداف كلسية فارغة .

تم تسجيل ٣٦ نوع من الكائنات القاعية والنباتات المائية hydrophyte من نوع Halophila stipulacea ونوع Posidonia بالمحطات أرقام بمعظم المحطات ما عدا المحطات رقم ٨ و ١١ . قدرت متوسط الكثافة بنسبة ٢٢,٥٪ من المجموع الكلي للاحياء القاعية حيث قدر متوسط المجموع الكلي للكثافة العددية للمجاميع بـ ٢٧٥٨ كائن / متر مربع وبعض الطحالب الخضراء بنسبة ٣,٤٪.

النباتات المائية

محطة ١، ١٢ : ساد العشب Ruppia cirrhosa فقط

محطة ٢: الطحلب الأخضر Caulerpa prolifera و العشب R. cirrhosa

محطة ٣: الأعشاب البحرية ثعبان الماء Zostera marina و Cymodocea nodosa

محطة ٤: الأعشاب البحرية Cymodocea nodosa و ثعبان الماء Z. marina و الطحلب الأخضر C. prolifera و

الطحلب الأخضر – الأصفر Hypnea Musciformis

محطة ٥: ساد الطحلب الأخضر C. prolifera وحده

محطة ٦: ساد العشب Cymodocea nodosa

محطة ٧: تواجدت الأعشاب البحرية ثعبان الماء Z. marina و C. nodosa

محطة ٩: الطحلب الأخضر C. prolifera و الأعشاب البحرية Cymodocea nodosa و ثعبان الماء Z. marina

محطة ١٠: رصدت الأعشاب Cymodocea nodosa و Z. marina و الطحلب الأخضر Ulva lactuca

محطة ١١: الطحلب الأخضر C. prolifera و العشب R. cirrhosa